




Informatie van uw tandarts

Immediaatprothese





Van eigen gebit naar kunstgebit

Op weg naar weer een stralende lach.

Een immediaatprothese wordt ook wel een noodprothese genoemd en wordt geplaatst direct na het trekken van de tanden en kiezen.



Het trekken van tanden en kiezen

Het trekken van tanden en kiezen wordt meestal niet in één keer gedaan. De behandelaar trekt eerst uw kiezen en daarna pas uw tanden. De tijd die hier tussen zit, is doorgaans enkele weken. Eten zal in die periode misschien wat lastig gaan. Het beste kunt u zacht voedsel eten. Daarna kunt u weer gewoon eten wat u gewend bent. Wel zal uw kauwvermogen afnemen. Soms wordt ervoor gekozen de tanden en kiezen in één keer te trekken. De behandelaar geeft u altijd uitleg over de mogelijkheden en de bijkomende voor- en nadelen.

U gaat nooit tandoos de praktijk uit.

Voordat de behandelaar alle tanden en kiezen trekt, wordt een afdruk gemaakt van uw kaak met de nog resterende tanden en of kiezen, zodat het tandtechnisch laboratorium een gipsmodel van de vorm van uw kaak kan maken. Hierop kan de immediaatprothese worden vervaardigd.

Het nieuwe gebit

Uw nieuwe kunstgebit zal de eerste dag waarschijnlijk niet meteen prettig zitten. Het kan klemmen en soms wat pijn veroorzaken. Toch mag u het gebit niet uit uw mond halen. Uw tandvles kan dan gaan zwellen, waardoor uw kunstgebit niet meer goed in uw mond past.

Nabloeden

De eerste uren na het trekken van uw tanden kan het tandvles nog wat nabloeden. Dit merkt u door de smaak en uw speeksel zal rood van kleur zijn. Dit stopt meestal vrij snel. Uw speeksel krijgt dan ook weer de normale kleur. De eerste 24 uur kunt u beter niet uw mond spoelen.

Er vormen zich bloedstolsels op de lege plekken in uw mond die met spoelen los geweekt worden. Het bloeden zal dan opnieuw beginnen. Drinken mag uiteraard wel.

Er bestaat een kleine kans dat het nabloeden niet stopt, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. Waarschuw dan uw behandelaar, ook als u pijn blijft houden. Neem bij eventuele pijn uitsluitend paracetamol als pijnstiller. Andere pijnstillers kunnen mogelijk een goede bloedstolling en een snelle wondgenezing verstoren.



Directe plaatsing

Vroeger liepen mensen voordat ze een kunstgebit kregen, een tijdje zonder tanden. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. De immediaatprothese (noodprothese) wordt onmiddellijk in uw mond geplaatst nadat de laatste tanden zijn getrokken. Dit betekent dat het direct over de verse wonden heen geplaatst wordt. Dat is misschien een vreemd idee, maar dit heeft een groot voordeel. Uw kunstgebit zit namelijk als een soort verband op de wonden. In het begin zal u moeten wennen. Geef dit een paar dagen de tijd om te beoordelen hoe uw nieuwe gebit aanvoelt.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw tandarts.

